



Ohjeita eläintarkastajille:

SMY:n hyväksymissä näyttelyissä voivat eläintarkastuksia tehdä vain SMY:n koulutuksen käyneet tarkastajat ja viralliset PET-tuomarit. SMY:lle tulee ilmoittaa, kuka/ketkä suorittavat eläintarkastukset.

ULKOLOISET

Ulkoloisia voi olla joko silmillä erotettavia tai mikroskooppisen pieniä -> ei silmillä nähtäviä, jolloin on tarkkailtava muita mahdollisia oireita.

Iholla tai turkissa elävät, silmillä nähtävät loiset

- ihossa tai turkissa missä kohden vain jotain liikkuvaa, mönkivää, luikertelevaa - pisanmuotoisia, pyöreitä, soikeita, pistemäisiä tai kuin liikkuvaa hilsettä

Iholla tai turkissa elävät, mikroskooppisen pienet loiset

Oireita voivat olla:

Hilse

- isoa leperemäistä tai pientä mujua, runsaasti -> mahdollisesti ihossa elävien loisten aiheuttamaa

Muut oireet

- iho ärtynyt/hilseilee runsaasti/punoittaa, ihossa haavaumia raapimisesta, turkki ohentunut selvästi ja mahdollisesti karva katkeilee
- puhallettaessa tai sormilla hierottaessa piste/otus ei lähde irti, vaan on tiukasti kiinni -> loinen tai loisen muna
- laita eläin valkoisen paperin päälle ja rapsuta ihoa ja turkkia epäilyttävästä kohdasta - katso paperia, hilse pysyy paikallaan, loinen liikkuu

Normaali vähäinen hilse irtoaa puhaltaessa tai sormilla hierottaessa.

Korvassa elävät loiset

- nähtävissä runsaasti ruskeaa kahvinporomaista eritettä -> mahd. korvapunkki

SIENI-INFEKTIOT – SILSA

- Zonoosi, tarttuu eläimestä tai sen kuivikkeista ym.
- Oireeton kantajuus !
- Eri alalajeja, monimuotoisia oireita
- Oireet alkaa huomaamattomasti
 - o vaaleaa hilseilyä
 - o karvattomia tai kaljuja laikkuja, hilseilyä, joskus alueet punoittavia
 - o rupia, hilsekasautumia, kokkareista hilseilyä
 - o turkin harventumaa, karvan katkeilua, turkin ohentumista
 - o karvat voivat lähteä tuppoina ja karvatupen kanssa
 - o kutinaa, jos iho on tulehtunut (bakteeritulehdus)
 - o usein ns. kriittisillä alueilla, missä on kosteaa, lian kanssa kosketuksissa, hankala huomata (tassunpohjien ja jalkakarvojen raja-alue, korvan takaosa, korvan lehti myös sisäpuolelta, mahanalus)
 - o voi myös esiintyä ihan missä vaan eläintä, myös kauttaaltaan



Silsatartunnan saaneen ihmisen oireet:

- o rengasmaisesti laajeneva muutos, muutamien senttien läpimitasta kymmeneen sentteihin, sisäkkäisiä renkaita, karvatupentulehdus

Varsinaisen diagnoosin tekee eläinlääkäri.

MUUT

- rohiseva hengitys, vuotavat silmät tai nenä
- tuoreet haavat ja tappelun jäljet
- heikko yleiskunto tai muuten sairaanoloinen
- tiine tai imettävä marsu ei saa osallistua näyttelyyn

Tärkeitä ohjeita

- ✓ lois/silsaepäilyn jälkeen pöydän ja käsien desinfiointi, mahd. vaatteiden vaihto
- ✓ suositeltavaa käyttää marsu/näytteilleasettajakohtaisia kertakäyttöisiä muoviessuja, kertakäyttöhanskoja ja eri vaatteita kuin mitä muutoin näyttelyn aikana pidetään
- ✓ Virkon S -liuos oikein laimennettuna ja voimassa olevana. Pinkkiväri on liuoksen indikaattori, ÄLÄ KÄYTÄ HAALEAA LIUOSTA. Tee jokaiseen näyttelyyn aina uusi liuos!

5.1.2014